



Circonstances de réalisation

- Premier accident thrombotique **avéré** (non suspecté) sans facteur déclenchant évident (immobilisation prolongée, plâtres, grossesse, post-partum, oestroprogestatifs, néoplasies, obésité, tabac...) survenant avant 60 ans.
- Et/ou accident thrombotique à répétition.
- Et/ou accident thrombotique de localisation atypique (ex : bilatérale, porte, mésentérique, cérébrale...)
- Et/ou accident thrombotique et antécédents thrombotiques familiaux significatifs
- Et/ou fausses couches à répétition ou antécédent obstétrical vasculaire grave (MFIU, RCIU, HRP, Eclampsie)

Analyses réalisables - Nature de l'échantillon - Tubes ou récipients

La liste des analyses ci-dessous a été établie par le groupe d'Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) concernant la **thrombophilie** (mai 2008 revue en 2022).

Analyses	Tubes ou récipients
NF	
Recherche de mutations des facteurs II et V	4 tubes EDTA  + fiche de consentement signée par le patient *
TP, TCA, fibrinogène, D-dimères	
Antithrombine (<i>non réalisable sous ACO</i>)	
Protéine C et Protéine S (<i>non réalisables sous AVK et ACO</i>)	4 tubes citratés 
Anticoagulant circulant (ACC) (<i>non réalisable sous ACO, Héparines</i>)	
Electrophorèse des protéines	
Anticorps anti nucléaires	3 tubes secs 
Anticorps anti-phospholipides : anti-cardiolipine et anti-bêta 2 GPI de type IgG et IgM	
CRP	1 tube hépariné avec séparateur 

***RAPPEL** : Ce bilan comporte des analyses génétiques (mutations des facteurs II et V) nécessitant l'information du patient, la **signature d'une fiche de consentement éclairé** par ce dernier et la remise des résultats par le médecin prescripteur.

Lieu et conditions de réalisation

Se référer à chacune des analyses comprises dans le bilan.