La qualité du résultat de cet examen dépend de la qualité du recueil.
Voici quelques conseils à respecter

Matériel :

- Flacon de recueil fourni par le laboratoire, ou Urinocol pour les enfants en bas âge.
- Savon ou lingette nettoyante

Quand recueillir ?

- Si possible, respecter un **intervalle de 3 heures entre la miction du recueil et la miction précédente** et **avant toute antibiothérapie**.
- A n'importe quel moment de la journée, en cas d'urgence.

Recueil des urines :



1. **Lavage soigneux des mains**

2. Effectuer **une toilette intime** soignée à l'aide d'eau et de savon ou d'une lingette nettoyante



3. **Dévisser le couvercle et le poser à l'envers sur une surface propre. Ne pas toucher l'intérieur** du flacon ni du bouchon.

4. **Commencer à uriner dans les toilettes (a) puis dans le flacon (b) sans dépasser le niveau « ◢ MAX »**
   Pour enfant en bas âge : Recueillir les urines par la pose d'un collecteur d'urines, après désinfection soignée de la peau (au Dakin dilué). Le laisser en place au maximum 1 heure, à changer si pas d'émission d'urines dans ce laps de temps.

5. **Revisser à fond le couvercle et inscrire NOM PRENOM et DATE DE NAISSANCE sur l'étiquette fournie par le laboratoire et la coller sur le flacon.**

6. Placer le flacon dans le sachet avec la fiche complétée et l'ordonnance.

Conservation – Transport :

7. Apporter l'échantillon **le plus rapidement possible au laboratoire** (maximum dans les 2 heures)
8. Ou conserver au réfrigérateur (maximum 12 heures)

Pour aider le laboratoire à interpréter vos résultats, merci de compléter les points suivants :

Nom – Prénom – Nom de naissance :……..
Date de naissance : ……
Date et heure du recueil : ……..

Présentez-vous - de la fièvre > 38°C	oui	☐	non	☐
- des brûlures mictionnelles	oui	☐	non	☐
- des douleurs lombaires	oui	☐	non	☐
Intervention urogénitale	oui	☐	non	☐
Grossesse	oui	☐	non	☐
Antécédents médicaux : Cystites à répétition	oui	☐	non	☐
Pyélonéphrites	oui	☐	non	☐
Diabète	oui	☐	non	☐
Calculs rénaux	oui	☐	non	☐

Si traitement antibiotique prévu, nom de l'antibiotique .....
Antibiotique pris avant le recueil oui ☐ non ☐